



جمعية صندوق إعانة البردي

أول مؤسسة طبية خيرية تأسست عام ١٩٧٩ م
على يد مجموعة من الأطباء الكويتيين

٥٦

سلسلة الوعي الصحي والثقافي

الاجهاض



الطبعة الثانية

م ٢٠٠٧ - ١٤٢٨

طبعت بدعم من شركة باب الخير

الإجهاض

❖ الإجهاض : هو خروج الجنين قبل ٨٢ أسبوعاً رحماً (الشهر الرابع).

ومع تقدم العلم وتطور العناية المركزية للأطفال الخدج ، فإن معدل الإجهاض أصبح أقل من ذي قبل.

❖ يحدث الإجهاض ما بين ٥١-٥٢٪ في كل حمل.

وأكثر وقت يحدث فيه الإجهاض في الأسابيع الـ ٣١ الأولى من الحمل وأحياناً يحدث الإجهاض قبل التأكد من حدوث الحمل بالفحص المخبري.

❖ ليس هناك سبب واضح لحدوث الإجهاض فقد يحدث الإجهاض لسيدة لم يسبق لها الحمل من قبل وقد يحدث لسيدة قد حملت أكثر من مرة ولها أطفال طبيعيون وقد يكون الإجهاض متكرراً.



أسباب الإجهاض:

الأسباب الوراثية:

أكثر من ٦٠٪ من أسباب الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى راجعة لتشوهات خلقية سببها خلل في تركيبة الكروموسومات عبارة عن تركيبة خاصة داخل نواة الخلية وكل كروموسوم يحمل صفات وراثية مثل لون الشعر ونوع الجنس ولون العين وفصيلة الدم ، وغيرها من الصفات البشرية الأخرى، عندما تتلخص البويضة بواسطة الكائن المنوي ويتشكل الجنين بإذن الله ، بعد أن يمر بمراحل انقسام عدّة ، تجتمع الكروموسومات من كل من الآب واليأة حاملة الصفات الوراثية لهما في الجنين الجديد... ولو حدث اختلال في عدد أو تركيبة الكروموسومات عند الجنين ، فقد يؤدي ذلك إلى موت وطرد الجنين وهذا هو الإجهاض وإنه لنعمـة من نعم الله عز وجل ولا لامتلاء الأرض بنسبة كبيرة من المعاقيـن والمشوهـين ولكن يجب أن نعلم هذا السبـب للإجهاض ليس بالضروري تكراره في الحمل اللاحق وغيرها أي أن هناك حالات خاصة يتكرر فيها الإجهاض لأسباب موجودة في الآب والأم وتظهر على جميع الأجنة في كل حمل وهذه قليلة مقارنة بالحمل.

أسباب تتعلق بالرحم:

١- وجود عيب خلقي في شكل الرحم ، فالمعروف أن الرحم يأخذ الشكل الكمثري وتجويفه يأخذ شكل مثلث مقلوب ليس له أية زوائد أو حواجز ، ولكن قد يكون هناك تشوه في شكل الرحم مثل وجود حاجز يقسم الرحم إلى قسمين متساوين أو حاجز صغير يقسم سقف الرحم فقط وذلك قد يؤدي إلى الإجهاض وبالإمكان معالجته بعمليات جراحية أصبحت سهلة الآن بعد تطور جراحة المناظير لإزالة هذه الحواجز.

٢- ارتخاء في عنق الرحم وعدم تحمله ثقل الحمل حيث يبدأ عنق الرحم بالاتساع محدثاً الإجهاض ويحدث ذلك كثيراً في الأشهر الثلاثة الوسطى (الرابع والخامس والسادس) وبالإمكان علاج ذلك بعمل ربط لعنق الرحم ويساعد على عدم اتساعه.

٣- التهاب رحمي: من قدرة الله سبحانه وتعالى أن عنق الرحم يقفل بمادة مخاطية لزجة وسميكه بعد الحمل مباشرة تمنع وصول أي التهابات للرحم ، ولكن قد تحدث التهابات كما في حالات انفجار جيب الماء وسهولة وصول البكتيريا إلى داخل الرحم ويؤدي ذلك إلى الإجهاض وعلاجه يكمن في التشخيص السريع ويعتمد على عمر الحمل

فإذا كان في الشهور الأخيرة فمن الأفضل ولادة الجنين المبكرة وإذا كان في الشهور الوسطى واستجابة للمضادات الحيوية ومن الأفضل الانتظار حتى يزيد وزن الجنين.

أسباب تتعلق بصحة الأم:

هناك أمراض كثيرة قد تؤثر على صحة الأم والجنين فعدم انضباط نسبة السكر في الدم عند السيدة المصابة بداء السكر قد يؤدي إلى الإجهاض لذلك ننصح السيدات بمراجعة الطبيب لضبط نسبة السكر قبل الحمل وذلك مهم جداً للتلافي والإجهاض المبكر.

- ❖ أمراض الكلي.
- ❖ بعض الأورام السرطانية ومعالجتها بالعقاقير والإشعاع قد يؤدي إلى الإجهاض.
- ❖ استعمال عقاقير بدون استشارة الطبيب خاصة المخدرة منها.
- ❖ تعرض الأم الحامل للإشعاع الكبير.
- ❖ الأمراض التناسلية.
- ❖ أمراض طفيلية مثل التوكسوبلازم.
- ❖ الإدمان وتعاطي المخدرات والكحول بالنسبة للسيدات وحتى التدخين قد يؤدي إلى الإجهاض.

هل تؤثر حياتنا اليومية على الحمل

أغلب النشاط اليومي للمرأة العادمة لا يؤثر على الحمل مثل النشاط المنزلي العادي وأغلب الوظائف الإدارية ، والمعاصرة الجنسية.

ووجود أعراض الحمل مثل القئ دليل كبير على تقدم وثبات الحمل إن شاء الله ، وإن كانت قد تؤثر على صحة المرأة خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى.

أنواع الإجهاض :

- ١- الإجهاض منذر: ينذر بنزول الحمل ولكنه قد يستمر بعد توقف نزول الدم.
- ٢- إجهاض محتم: يحدث توسيعة في عنق الرحم وينزل كيس الحمل في عنق الرحم.
- ٣- إجهاض منسي: موت الجنين ويقاوده داخل الرحم.
- ٤- إجهاض غير مكتمل ترزو ببعض أجزاء من الحمل ويقاء الأجزاء الأخرى مثل المشيمة داخل الرحم.

اعراض الإجهاض المنذر:

- ١- نزول دم بسيط متقطع قد يكون لونه أحمر قاتم أوبني غامق.
- ٢- آلام محتملة بسيطة أسفل البطن.

الإجهاض المتدرب قد يستمر بضعة أسابيع وأشهر وقد يستمر الحمل حتى الشهور الأخيرة في أكثر من ٥٠٪ من الحالات ولكن إذا:

- ١- زادت كمية الدم و مدته.
 - ٢- زادت آلام أسفل البطن.
 - ٣- نزول قطع صغيرة من أنسجة الحمل.
- وهنا يحدث الإجهاض.

وقد يكون الإجهاض غير مكتمل أي أن هناك بواعي حمل داخل الرحم ويسمى إجهاضاً غير مكتمل وبالتالي يحتاج الرحم إلى تفريغ وذلك ما يسمى بفتح الرحم لتفادي استمرار النزيف.

أما الإجهاض المنفي:

وهو أن يموت الجنين بدون أعراض ، أي بدون نزول دم أو آلام ويحتاج لذلك إلى عملية كحت لإزالته بعد عمل فحوصات معينة واستنفاد الفرص لنزوله تلقائياً.

إذا تكرر الإجهاض أكثر من ثلاثة مرات :

يجب مراجعة الطبيب قبل الشروع في الحمل اللاحق لعمل فحوصات مكثفة للتأكد من خلوك من أمراض معينة مسببة للإجهاض.

أسباب الإجهاض المتكرر:

- ١- الالتهابات التي تصيب الحامل إما أن تكون بكتيرية أو فيروسية ، ووجود مضاداتها داخل جسم الحامل قد يقتل الجنين في كل حمل لاحق.
- ٢- اتساع عنق الرحم : وعدم تحمله ثقل الجنين عند بعض السيدات خاصة بعد الشهر الثالث والذي يحتاج إلى ربط لعنق الرحم.
- ٣- التشوهات الرحمية : كوجود رحمين صغيرين أو حاجز رحمي أو رحم صغير جداً والذي لا يتحمل حجم الجنين مع تقدم الحمل.
- ٤- تشوهات خلقية في الجنين: خاصة المتكررة لوجود عامل وراثي ثابت أو وجود صلة قرابة بين الوالدين.
- ٥- وجود مضادات معينة داخل الحامل ضد الجنين.
- ٦- عدم تناسب دم الأم مع الجنين خاصة حالات عامل رايزوس السالب في الأم وقد يحتاج الأمر إلى نقل دم للجنين داخل الرحم.
- ٧- زيادة نسبة تجلط الدم داخل المشيمة مما يؤدي إلى انفصالها وموت الجنين وتعالج حالياً بعقاقير ضد التجلط.

بعد الإجهاض والكمت:

- ١- قد يحدث التبويض خلال أسبوعين عند بعض السيدات وبالتالي تكون فرص الحمل كبيرة لذلك وجب الاحتياط لمن تريده تأجل الحمل بأخذ موانع الحمل.
- ٢- قد يستمر نزول الدم من ٧ - ٤١ يوم (دم خفيف)
- ٣- إذا كانت فصيلة دمك (عامل رايزوس) سالب فيجب أن تأخذ حقنة خاصة لتمنع المضادات في جسمك خلال ٢٧ ساعة من الإجهاض.

أختي في الله ...

احتسبي الأجر إذا ابتليت بالمرض حتى لا تضيع معاناتك هباءً منتثراً فيكفيك أن الخطايا تساقط كما تساقط أوراق الشجر.
ابذلي السبب واصدري العلاج ولا تياسي بعد التوكل على الله عز وجل.

شكراً وتقدير

لط. سميرة العوضي

استشاري أمراض النساء والتوليد
لساهمتها في تقديم المادة العلمية
فجزاها الله خير الجزاء